



Materiale informativo richiesto
dall'autorità competente

STALLERGENES  GREER

Life beyond allergy

PALFORZIA[®] e te

Informazioni di sicurezza importanti su PALFORZIA[®] ▼
(Allergeni dell'arachide [*Arachis hypogaea*])

Guida per la sicurezza dei pazienti

Fascia d'età 12-17 anni



▼ Questo medicamento è soggetto a monitoraggio addizionale. Ciò consente una rapida identificazione delle nuove conoscenze in materia di sicurezza. Chi esercita una professione sanitaria è invitato a segnalare qualsiasi sospetto di un effetto collaterale nuovo o grave. Per informazioni sulla segnalazione degli effetti collaterali, vedere l'ultima pagina.





Indicazioni terapeutiche

PALFORZIA® può essere utilizzato in pazienti di età compresa tra 1 e 17 anni con diagnosi confermata* di allergia clinicamente rilevante alle arachidi, al fine di aumentare la dose soglia di arachidi tollerata senza comparsa di reazioni allergiche.

Il trattamento con PALFORZIA® può essere continuato, se necessario, nei pazienti di età pari o superiore a 18 anni.

PALFORZIA® deve essere utilizzato solo come misura complementare a una dieta che esclude le arachidi.

Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso di PALFORZIA® all'indirizzo www.swissmedicinfo.ch

* Per la diagnosi confermata devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

- anamnesi con reazioni allergiche alle arachidi
- prova di una sensibilizzazione specifica (IgE e/o prick test cutaneo)
- reazione in un test di provocazione orale con una dose soglia ≤ 300 mg di proteine di arachidi o prova di una sensibilizzazione forte e conclusiva.

Trattamento con PALFORZIA®: una guida per adolescenti

Se sei un adolescente allergico alle arachidi a cui è stato prescritto PALFORZIA®, questa guida è pensata proprio per te. Ha lo scopo di rispondere alle tue domande sul trattamento con PALFORZIA®.

Questa guida contiene le seguenti informazioni:

- Cos'è PALFORZIA® e chi può assumerlo e chi no
- Come e quando devi assumere PALFORZIA®
- Gli effetti collaterali che potresti avere dopo aver assunto PALFORZIA® e cosa fare se si verificano
- Altre informazioni importanti sulla sicurezza durante l'assunzione di PALFORZIA®

Guide e video

È disponibile anche un opuscolo per la persona che ti assiste e una serie di video su PALFORZIA® che puoi guardare. A tal fine, scansiona il codice QR sottostante o visita il seguente sito web

www.stallergenesgreer.ch/patienteninformation

Anche se abbiamo cercato di includere tutto ciò che devi sapere su PALFORZIA®, puoi chiedere al tuo medico ulteriori informazioni sui singoli punti di questa guida. Ulteriori informazioni sono disponibili anche nel foglietto illustrativo allegato alla confezione di PALFORZIA®.

Suggerimento: tieni la fotocamera del tuo cellulare sopra il codice QR per aprire il link.



Indice

Pagina 7 Sezione 1: Alcune cose importanti da tenere a mente

Pagina 14 Sezione 2: Informazioni su PALFORZIA®

Pagina 16 Sezione 3: Possibili effetti collaterali di PALFORZIA®

Pagina 18 Sezione 4: L'assunzione di PALFORZIA®

Pagina 26 Sezione 5: Altre informazioni pratiche

Riepilogo delle informazioni di sicurezza

È importante leggere e comprendere le seguenti informazioni. In caso di domande, non esitare a rivolgerti al tuo medico.

PALFORZIA® è un medicamento per il trattamento dell'allergia alle arachidi e, come tutti i medicamenti, può avere effetti collaterali.

Questa guida contiene informazioni importanti sull'uso sicuro del medicamento. Prima di approfondire l'argomento, è necessario spiegare due possibili effetti collaterali che possono verificarsi con PALFORZIA®: **anafilassi ed esofagite eosinofila (EoE)**.

Per ridurre al minimo il rischio di una reazione, devi sapere:

- quali sintomi tenere sotto controllo;
- quando contattare il tuo medico o il pronto soccorso;
- cosa fare o non fare durante il trattamento.

L'anafilassi è un tipo di reazione allergica che può colpire contemporaneamente diverse parti del corpo. Può manifestarsi in forma da lieve a grave ed essere pericolosa per la vita. Le reazioni possono verificarsi immediatamente o alcune ore dopo il contatto con un allergene. L'anafilassi può comprendere una combinazione dei seguenti sintomi:

- difficoltà respiratorie
- **sensazione di oppressione** o di corpo estraneo in gola
- **difficoltà di deglutizione o problemi di linguaggio**
- **alterazione della voce**
- **vertigini** o svenimento o **sensazione di pericolo imminente**
- forti crampi o dolori allo stomaco, vomito o diarrea
- **forte sensazione di calore, arrossamento (flush)** o prurito cutaneo

Se manifesti una combinazione di questi sintomi e sospetti un'anafilassi, segui il tuo piano di emergenza per l'anafilassi, usa la penna di adrenalina secondo le istruzioni riportate sulla confezione e chiama il pronto soccorso.

Se hai domande o dubbi sull'uso della penna di adrenalina, parla con il tuo medico, che potrà spiegarti come e quando usarla.

L'esofagite eosinofila (EoE) è una malattia in cui un tipo specifico di globuli bianchi (chiamati eosinofili) si accumula nell'esofago.

È stata segnalata in alcune persone con allergia alle arachidi che ricevono immunoterapia orale.

I segni dell'esofagite eosinofila possono includere:

- difficoltà di deglutizione
- rimanere con il cibo bloccato in gola
- bruciore al petto, alla bocca o alla gola
- reflusso (rigurgito)
- **difficoltà nell'assunzione di cibo**
- **mancato aumento di peso corporeo**
- **diminuzione dell'appetito**

Se si manifesta uno di questi sintomi, rivolgiti al tuo medico, che ti visiterà accuratamente per verificare la presenza di eventuali problemi gastrici. Se c'è un sospetto di EoE, il trattamento con PALFORZIA® verrà interrotto.

Altri possibili effetti collaterali

Grave reazione allergica, tosse, irritazione della gola, senso di oppressione alla gola, dolore alla gola e alla bocca, rinite allergica (naso che cola, starnuti, prurito al naso, fastidio nasale), starnuti, naso chiuso, vomito, mal di stomaco, malessere allo stomaco (nausea), prurito alla bocca, formicolio o intorpidimento alla bocca, prurito, eruzione cutanea, pomfi.

Cosa fare e cosa non fare

Per ridurre al minimo il rischio di effetti collaterali, assicurati di rispettare le seguenti regole relative al trattamento con PALFORZIA®.

✓ Cosa fare X Cosa non fare



ASSUMERE PALFORZIA® ogni giorno



ASSUMERE PALFORZIA® con il cibo



ASSUMERE PALFORZIA® all'incirca alla stessa ora ogni giorno (preferibilmente a cena)



Portare sempre con sé la penna di adrenalina



NON mangiare arachidi



NON ASSUMERE PALFORZIA® se non si sta bene



NON ASSUMERE PALFORZIA® nelle 2 ore prima di andare a dormire



NON ingoiare la capsula e NON inalare la polvere



NON bere alcolici 2 ore prima o dopo l'assunzione di una dose



NON fare sport, docce calde o bagni caldi subito prima o nelle 2-3 ore successive all'assunzione di PALFORZIA®



1

**Alcune cose
importanti da
tenere a mente**



X

Non devi **mangiare arachidi o alimenti che contengono arachidi anche dopo aver assunto PALFORZIA®**.



Devi portare **sempre** con te la penna di adrenalina.





Devi assumere il medicamento **ogni giorno all'incirca alla stessa ora insieme al cibo.** Preferibilmente a cena.



Non devi ingoiare le capsule di PALFORZIA®. Le capsule e le bustine vanno aperte e il contenuto va mescolato a un alimento che non sia troppo caldo o troppo liquido.

✓ A tal fine sono adatti, tra gli altri, i seguenti alimenti:

riso al latte, purea di frutta o yogurt.

✗ Tra gli alimenti con cui non devi mescolare PALFORZIA® ci sono le zuppe e i frullati.





X

Assicurati di **non correre o fare sport** subito prima e nelle 2-3 ore successive all'assunzione di PALFORZIA®.



X

Non assumere PALFORZIA®
se non ti senti bene.

X

Non fare bagni caldi o docce calde immediatamente prima dell'assunzione di PALFORZIA® e per 2-3 ore dopo l'assunzione.



X

Non assumere PALFORZIA® nelle 2 ore prima di andare a dormire.



X

2 ore prima o dopo
l'assunzione di una
dose **non puoi bere
alcolici.**



Le mestruazioni possono
modificare la reazione
dell'organismo a PALFORZIA®.

**Se hai il ciclo mestruale e compaiono
sintomi allergici, parlane assolutamente
con il tuo medico, che potrebbe modificare
la tua dose di PALFORZIA®.**





Alcuni antidolorifici (come l'ibuprofene e l'aspirina) possono alterare la risposta dell'organismo a PALFORZIA®. **Presta particolare attenzione se stai assumendo questi medicinali.**



Se necessario, consulta il tuo medico anche se si verifica una delle seguenti condizioni:

- **hai il raffreddore o un'infezione influenzale**
- **il tuo asma peggiora**
- **ti senti molto stressato**
- **sei insolitamente stanco o dormi male da diversi giorni**

2

Informazioni su PALFORZIA®

Chi non può assumere PALFORZIA®?

PALFORZIA® non deve essere assunto in presenza dei seguenti problemi:

- Ipersensibilità a uno qualsiasi degli eccipienti (vedi il foglietto illustrativo).
- Asma grave o incontrollato
- Difficoltà di deglutizione o problemi a lungo termine con il sistema digestivo
- Sindrome da enterocolite indotta da proteine alimentari (FPIES, una reazione intestinale ritardata alle proteine alimentari che provoca vomito violento e incontrollabile) negli ultimi 12 mesi
- Problemi di crescita o sviluppo, ad esempio un disturbo della crescita (vale per i bambini di età compresa tra 1 e 3 anni)
- Grave malattia dei mastociti
- Ipertensione non adeguatamente controllata o malattia cardiovascolare
- Anafilassi grave o potenzialmente letale nei 60 giorni precedenti l'inizio del trattamento con PALFORZIA®

Se non sei sicuro o non hai mai sentito parlare di una di queste malattie, consulta il tuo medico, che potrà fornirti spiegazioni più dettagliate.

Sono ancora allergico alle arachidi anche se assumo PALFORZIA®?

Sì, sei ancora allergico alle arachidi, anche se potresti non avere più una reazione allergica se mangi accidentalmente un'arachide. PALFORZIA® mira a desensibilizzare il tuo sistema immunitario alle arachidi, ma non è una cura per l'allergia alle arachidi.

È molto importante che tu continui ad assumere PALFORZIA® ogni giorno per mantenere la desensibilizzazione. Devi anche continuare a evitare le arachidi e portare sempre con te la penna di adrenalina.

Per quanto tempo devo assumere PALFORZIA®?

L'assunzione quotidiana di PALFORZIA® è necessaria per mantenere l'efficacia e la tollerabilità.

Attualmente sono disponibili dati di efficacia per un trattamento fino a 24 mesi con PALFORZIA®.



Promemoria:

Non puoi mangiare arachidi anche dopo aver assunto PALFORZIA®.

3

Possibili effetti collaterali di PALFORZIA®

Effetti collaterali di PALFORZIA®

Come tutti i medicinali, PALFORZIA® può causare effetti collaterali, che tuttavia non si verificano in tutti i casi.

Ciò è dovuto al fatto che con PALFORZIA® si assumono intenzionalmente proteine di arachidi. Sulla base dei risultati degli studi clinici condotti con PALFORZIA®, è necessario tenere conto della possibilità di reazioni allergiche. La maggior parte di esse è tuttavia di entità lieve o moderata e con il tempo si manifesta con minore frequenza.

Effetti collaterali importanti:

- Difficoltà respiratorie
- **Sensazione di oppressione** alla gola o gonfiore
- **Difficoltà di deglutizione**
- **Alterazioni della voce**
- **Vertigini** o svenimenti o **sensazione di pericolo imminente**
- Forti crampi o dolori allo stomaco, vomito o diarrea
- **Forte sensazione di calore**, grave arrossamento o forte prurito della pelle
- Aggravamento dell'asma o di altri disturbi respiratori
- Bruciore di stomaco, difficoltà di deglutizione, dolore durante la deglutizione o dolore toracico che non scompare o peggiora

Il tuo medico parlerà con te e con i tuoi genitori o con chi si prende cura di te di questi effetti collaterali in modo che tu possa prestare attenzione e sapere cosa fare se si verificano effetti collaterali. Devi informare il tuo medico se noti uno qualsiasi di questi effetti collaterali.

Anafilassi

PALFORZIA® può causare gravi reazioni allergiche che possono essere pericolose per la vita. I sintomi di una reazione allergica a PALFORZIA® possono includere:

- difficoltà respiratorie
- sensazione di oppressione o **sensazione di corpo estraneo in gola**
- **difficoltà di deglutizione o problemi di linguaggio**
- **alterazione della voce**
- **vertigini** o svenimento o **sensazione di pericolo imminente**
- forti crampi o dolori allo stomaco, vomito o diarrea
- **forte sensazione di calore, arrossamento (flush)** prurito cutaneo

Se manifesti uno di questi sintomi, devi interrompere l'assunzione di PALFORZIA®, trattare la reazione secondo le istruzioni del medico e poi rivolgerti **immediatamente** a un medico. Queste reazioni possono manifestarsi subito dopo l'assunzione del medicamento o fino a qualche ora dopo.

Esofagite eosinofila

PALFORZIA® può causare sintomi a livello gastrointestinale, tra cui un problema all'esofago, chiamato esofagite eosinofila. I segni dell'esofagite eosinofila possono includere:

- difficoltà di deglutizione
- rimanere con il cibo bloccato in gola
- bruciore al petto, alla bocca o alla gola
- reflusso (rigurgito)
- **difficoltà nell'assunzione di cibo**
- **mancato aumento di peso corporeo**
- **diminuzione dell'appetito**

Se questi sintomi persistono, consulta un medico.

Usa la penna di adrenalina e recati immediatamente dal medico se manifesti uno dei seguenti sintomi:

- difficoltà respiratorie
- sensazione di oppressione o **sensazione di corpo estraneo in gola**
- difficoltà di deglutizione o **problemi di linguaggio**
- **alterazione della voce**
- vertigini o svenimento o **sensazione di pericolo imminente**
- forti crampi o dolori allo stomaco, vomito o diarrea
- **Forte sensazione di calore, arrossamento (flush)** o prurito cutaneo
- peggioramento dell'asma o altri disturbi respiratori che peggiorano
- bruciore di stomaco, difficoltà di deglutizione, dolore durante la deglutizione o forte dolore al petto che non scompare o peggiora

Il medico parlerà con te e con i tuoi genitori o con chi si prende cura di te su come prestare attenzione a questi sintomi e cosa fare se si manifestano.


4 L'assunzione di PALFORZIA®

Le tre fasi del trattamento

Se il tuo medico ha deciso che puoi iniziare ad assumere PALFORZIA®, avvierà la prima delle tre fasi di dosaggio. Questo avviene per poter aumentare gradualmente la quantità di medicamento che assumi nel corso del tempo. In determinati momenti potresti dover mantenere la stessa dose più a lungo, ridurre la dose o interrompere completamente l'assunzione. Il tuo medico ti consiglierà quando potrebbe essere il caso.

Nella prima fase, chiamata fase di dosaggio iniziale, riceverai PALFORZIA® in capsule. Nella seconda fase, chiamata fase di aumento del

dosaggio, riceverai PALFORZIA® in capsule fino all'ultimo livello di dosaggio, che viene fornito in una bustina. Nella terza fase, la cosiddetta terapia di mantenimento, riceverai PALFORZIA® in una bustina. In tutte le fasi, PALFORZIA® deve essere preso dalle capsule o dalla bustina e mescolato al cibo in modo da poterlo mangiare.



☰ Fase iniziale di aumento del dosaggio (due giorni)

Quando inizi ad assumere PALFORZIA[®], ti rechi dal medico per due giorni consecutivi.

Giorno 1

1. Se ti senti abbastanza bene da iniziare il trattamento, ti verrà somministrata una **dose di PALFORZIA[®]** ogni 30 minuti sotto la supervisione del medico, fino a quando non avrai assunto **cinque dosi**.
2. Se in questa fase compaiono sintomi che richiedono un intervento medico (ad es. somministrazione di adrenalina), il trattamento con PALFORZIA[®] verrà interrotto.
3. La dose di PALFORZIA[®] inizialmente è molto bassa e viene aumentata gradualmente. Dopo l'assunzione di ogni dose, il medico controlla che tu stia bene.
4. Dopo aver assunto la quinta dose, devi rimanere nello studio medico per almeno 1 ora, in modo che il medico possa assicurarsi che tu stia bene.
5. Se tolleri la quarta dose, ma non la quinta, puoi continuare il trattamento, ma devi tornare allo studio medico prima dell'inizio della seconda fase del trattamento.

Giorno 2

1. Il medico effettua alcuni esami sanitari e ti chiede come ti sei sentito il giorno prima, quando sei tornato a casa. Se ti senti bene e gli esami hanno dato esiti positivi, il medico ti somministrerà una dose di PALFORZIA[®] e controllerà che tu stia bene.
2. Se tolleri bene questa dose, ti verrà fornita una scorta di dosi di PALFORZIA[®] sufficiente per due settimane.
3. Nelle due settimane successive dovrai assumere PALFORZIA[®] a casa, una volta al giorno durante i pasti.

Promemoria: quando assumi PALFORZIA[®] a casa, devi seguire le istruzioni (a pagina 22). Se ti senti male o noti una reazione allergica, parlane con i tuoi genitori e/o il tuo medico.

≡ Fase di aumento del dosaggio (circa sei mesi)

- Dopo due settimane tornerai dal medico per ricevere una nuova dose leggermente più alta di PALFORZIA®.
- **Nei giorni in cui vai dal medico, non devi assumere la dose di PALFORZIA® a casa.**
- Se il trattamento procede bene, il medico ti prescriverà una nuova dose più forte. Dovrai quindi rimanere nello studio medico per almeno 1 ora prima di poter tornare a casa.
- A casa dovrai assumere PALFORZIA® ogni giorno all'incirca alla stessa ora. Dopo due settimane tornerai dal medico e, se tutto procede bene, ti verrà somministrata una nuova dose leggermente più alta.
- Ripeterai questa assunzione quotidiana a casa per circa sei mesi e continuerai ad andare dal medico. Nel frattempo, la tua dose di PALFORZIA® verrà aumentata da 3 mg (circa 1% delle proteine contenute in un seme di arachide) a 300 mg (circa la stessa quantità di proteine contenuta in un seme di arachide intero) al giorno, in 11 livelli di dosaggio.
- È possibile che il medico prescriva una dose inferiore o che si mantenga la stessa dose più a lungo se si verificano effetti collaterali. In questo modo il corpo può abituarsi alla dose. Il medico ti spiegherà cosa fare in questo caso.
- Il medico si assicurerà che tu riceva la dose corretta di PALFORZIA® da assumere quotidianamente a casa fino alla tua prossima visita medica.



≡ Terapia di mantenimento

- Se riesci ad assumere in modo sicuro la dose giornaliera di 300 mg, hai raggiunto la terza fase, detta terapia di mantenimento.
- **Come in precedenza, il giorno in cui vai dal medico non assumi la tua dose abituale di PALFORZIA® a casa.**
- Ti verrà consegnata una confezione con una scorta mensile di bustine da 300 mg di PALFORZIA® da portare con te. **A pagina 22** troverai le istruzioni su come mescolare PALFORZIA® al cibo.
- Durante la fase di mantenimento del trattamento, il medico ti dirà con quale frequenza dovrai presentarti a un appuntamento di controllo.
- Dopo l'assunzione, presta particolare attenzione per circa 1 ora e assicurati che un adulto sia nelle vicinanze per aiutarti nel caso in cui dovessi manifestare sintomi di una reazione allergica.

300 mg



Promemoria:



- Devi continuare ad assumere PALFORZIA® ogni giorno affinché abbia effetto correttamente.



- Devi continuare a prestare molta attenzione e non mangiare arachidi e alimenti che contengono arachidi.



- Devi continuare a portare sempre con te la penna di adrenalina.

Mescolare PALFORZIA® con il cibo

- 1** PALFORZIA® è disponibile in capsule o bustine, a seconda del livello di dosaggio: capsule con un contenuto fino a 240 g e bustine con un contenuto di 300 g. Le capsule e le bustine contengono una polvere che tu o i tuoi genitori dovete mescolare con una piccola quantità di cibo morbido, non troppo caldo o troppo liquido (yogurt, riso al latte o purea di frutta sono ottimi esempi).
- 2** Assicuratevi di non mescolare PALFORZIA® con troppo cibo, in modo da poter assumere l'intera dose in pochi cucchiaini. Inoltre, il cibo non deve essere riscaldato.
- 3** Assumi l'intera dose giornaliera dalla confezione di PALFORZIA®. Se utilizzi le capsule, la dose giornaliera si trova in un singolo blister della confezione e può consistere in una o più capsule, a seconda della dose. Se utilizzi le bustine, una bustina corrisponde alla dose giornaliera completa.
- 4** Se utilizzi una o più capsule, apri ciascuna capsula sopra il cibo. Se utilizzi una bustina, tienila sopra il cibo e tagliala nella parte superiore con delle forbici.
- 5** Versa l'intero contenuto delle capsule o della bustina nel recipiente con il cibo.

6

Mescola la polvere nel cibo fino a quando non è completamente amalgamata e senza grumi.

7

Getta la bustina vuota o le capsule vuote in un contenitore per rifiuti.

8

Assicurati di assumere l'intera quantità di ogni dose giornaliera.

9

La dose di PALFORZIA® mescolata con il cibo può essere preparata e conservata in frigorifero fino a otto ore.

10

Se non consumi la dose entro otto ore dalla preparazione, devi gettarla e prepararne una nuova.

11

Lavati immediatamente le mani dopo aver maneggiato le capsule o le bustine di PALFORZIA®.

Per comprendere le dosi di PALFORZIA®

La fase di aumento del dosaggio di PALFORZIA® è suddivisa in 11 livelli.

Ad ogni livello, la dose giornaliera di PALFORZIA® viene leggermente aumentata.

Nei primi 10 livelli, le dosi sono disponibili in capsule di forma, dimensione e colore diversi, raggruppate in blister separati. All'11° livello e durante la terapia di mantenimento, la dose giornaliera è disponibile in una bustina.

Le immagini mostrano le capsule e le bustine per ogni livello della fase di aumento del dosaggio.

È importante registrare il numero di lotto di PALFORZIA®. Pertanto, ogni volta che ricevi una nuova confezione di PALFORZIA®, annota la data e il numero di lotto (che si trova sulla confezione dopo «Ch.-B.») e conserva queste informazioni in un luogo sicuro.

Livello 1

(dose giornaliera 3 mg)



Livello 2

(dose giornaliera 6 mg)



Livello 3

(dose giornaliera 12 mg)



Livello 4

(dose giornaliera 20 mg)



Livello 5

(dose giornaliera 40 mg)



Livello 9

(dose giornaliera 200 mg)



Livello 6

(dose giornaliera 80 mg)



Livello 10

(dose giornaliera 240 mg)



Livello 7

(dose giornaliera 120 mg)



Livello 11

(dose giornaliera 300 mg)



Livello 8

(dose giornaliera 160 mg)



5

Altre informazioni pratiche

Dove deve essere conservato PALFORZIA®?

Conservare PALFORZIA® a casa in un luogo in cui la temperatura ambiente non superi i 25 °C. In altre parole: conservare il medicamento in un luogo a temperatura ambiente moderata, lontano dalla luce solare diretta. Un armadio fresco e buio potrebbe essere il luogo più adatto.

Se il medico ti ha detto che un livello di aumento del dosaggio è stato completato, devi gettare tutte le dosi rimanenti (capsule o bustine) di quella confezione prima di iniziare un nuovo livello di dosaggio. Questo vale anche per tutte le dosi aggiuntive contenute in ogni confezione che non hai utilizzato.

Come devo usare la scheda del paziente di PALFORZIA®?

Ti verrà fornita una scheda del paziente che informa le altre persone che stai assumendo PALFORZIA®. Sulla scheda dovrai scrivere i tuoi dati personali e mostrarla a un medico, a un infermiere o al personale di cura quando ti rechi dal medico o in ospedale.

La scheda del paziente PALFORZIA è un documento di carta con un titolo rosso "Scheda del paziente". Sotto il titolo, ci sono campi per scrivere i dati personali: Nome, Indirizzo, Telefono, Sesso, Età, Data di nascita, e un campo per il contatto di emergenza (nome e numero). In basso, c'è una sezione con un sfondo rosso che contiene avvertenze importanti in italiano, come "Questo prodotto contiene PALFORZIA (ARABIDIN) e PALFORZIA (ARABIDIN) con glutine" e "Se sei allergico al grano, al frumento o al glutine, non assumere questo prodotto".

Cosa succede con le altre malattie allergiche di cui soffro (ad es. asma, raffreddore da fieno, eczema, allergie ad altri alimenti)?

Per quanto riguarda le altre allergie, devi continuare a ricevere cure adeguate. Se utilizzi determinati medicinali per altre allergie (inalatori, creme o compresse), devi continuare a farlo.

I tuoi genitori o la persona che ti assiste decideranno se è meglio per te saltare la dose di PALFORZIA® per un giorno e vedere come ti senti il giorno successivo. Tu e i tuoi genitori o la persona che ti assiste dovete rivolgervi al vostro medico in caso di domande.

Gravidanza e PALFORZIA®

Non iniziare a prendere PALFORZIA® se sei incinta o stai pianificando una gravidanza. Se sei incinta o stai allattando, se pensi di essere incinta o se intendi rimanere incinta, consulta il tuo medico o il farmacista prima di assumere questo medicamento.

Alcol e PALFORZIA®

Il consumo di alcol o l'assunzione di medicinali contenenti alcol può aumentare la probabilità di una reazione allergica dopo l'assunzione di PALFORZIA®.



Segnalazione di effetti collaterali

Se si notano effetti collaterali, rivolgersi al proprio medico o farmacista.
Ciò vale in particolare anche per gli effetti collaterali non indicati in
questo foglietto illustrativo.

Leggere il foglietto illustrativo.

STALLERGENES  GREER

Life beyond allergy